

男性機能障害ED治療薬比較表

商品名	バイアグラ	レビトラ	シアリス
一般名	クエン酸シルデナフィル	塩酸バルデナフィル水和物	タダラフィル
製造元	ファイザー	バイエル薬品	日本イーライリリー
発売日		2003年(日本では2004年に認可)	2003年(日本では2007年に認可)
剤形・規格	(先発)『錠、ODフィルム:25mg・50mg』 (後発)『錠、OD錠:25mg・50mg』	錠:5mg・10mg・20mg	錠:5mg・10mg・20mg
用法用量	1日1回25～50mg 投与間隔:24時間以上	1日1回10mg、20mgに増量可能 投与間隔:24時間以上	1日1回10mg、20mgに増量可能 投与間隔:24時間以上
併用禁忌薬	<ul style="list-style-type: none"> 硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等) 塩酸アミオダロン (アンカロン錠) sGC刺激剤 (アデムバス錠) 	<ul style="list-style-type: none"> 硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等) CYP3A4阻害剤 (リトナビル、インジナビル、アタザナビル、サキナビル、メシル酸サキナビル、ホスアンブレナビル、ロピナビル・リトナビル、ケトコナゾール、イトラコナゾール、コビススタットを含有する製剤(スタリビルド)) クラスIA抗不整脈薬 (キニジン、プロカイナムド等) クラスIII抗不整脈薬 (アミオダロン、ソタロール等) 	<ul style="list-style-type: none"> 硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等) sGC刺激剤 (アデムバス錠)
作用発現時間	30～60分	10～45分	30分～2時間
作用持続時間	4時間	8時間	36時間
食事との関係	影響を受けやすいため、空腹時での内服	影響あり、高脂肪食で効果低下	影響なし
	柑橘類(グレープフルーツ、スイーティ、ハッサク、夏みかんなど)は、効果を弱めますので、避けて下さい。		
価格	先発) 25mg:1,100～1,300円 50mg:1,300～1,500円 後発) 50mg:850～1,250円	5mg:900～1,100円 10mg:1,100～1,500円 20mg:1,500～2,000円	5mg: 10mg:約1,500円 20mg:1,500～1,800円
特徴	刺激があれば反応しやすいだけ。	普段よりも少ない刺激で勃起できる。	副作用が少なく、長時間効果が期待できる。
	他の薬剤に比べると、硬さが出やすいという方が多い。	硬さが出やすく、刺激に対して鈍感になり、射精までの時間が延長する傾向がある。	食事の内容やタイミングを気にせず使える。
	食事に対して弱いため、空腹時で服用する必要がある。	一度起こった勃起が衰えにくくなる。	他剤に比べると、効き方がマイルド、自然な効き心地がある。
		治験によると、普段の2.4～3倍程度、挿入時間が延長したという報告がある。	強く硬い勃起で起こる違和感も少ないため、射精感の遅延が少ない。
副作用	顔の火照り、頭痛、動悸、頻脈、紅潮、鼻づまり、目の充血		
	視覚に関すること(視界に色がかかるなど)	胃の不快感	背部痛、その他筋肉痛
感想	一番硬くなるから好み。	すぐに効く。	自然な感じの勃起が得られる
	昔から使っているから。		男性の性感が損なわれずに良い
			食事などを気にせずに効果が期待できるので便利